

Difusión de la prevención del VIH

**Global HIV Prevention
Working Group**

Junio de 2007

Global HIV Prevention Working Group

- Creado en 2002 para proporcionar información para la creación de políticas globales, la planeación de programas y las decisiones de los donantes
- Convocado por las fundaciones Bill & Melinda Gates y Henry J. Kaiser Family
- Equipo internacional formado por investigadores, defensores y expertos en sanidad pública
- Emite hojas de datos e informes periódicos sobre política y ciencia de la prevención
- Lucha por una respuesta integral y científica ante el VIH/SIDA

Informes PWG anteriores

- *Global Mobilization for HIV Prevention: A Blueprint for Action* (julio de 2002)
- *Access to HIV Prevention: Closing the Gap* (mayo de 2003)
- *HIV Prevention in the Era of Expanded Treatment Access* (junio de 2004)
- *New Approaches to HIV Prevention: Accelerating Research and Ensuring Future Access* (agosto de 2006)

Nuevo informe sobre la difusión

- Todas las formas de transmisión del VIH pueden prevenirse
 - ✓ Pruebas sólidas de la eficacia de la prevención y modelos reproducibles de difusión de la prevención
- Pero las iniciativas para reducir el número de casos no son constantes
 - ✓ Acceso limitado a las intervenciones de prevención
 - ✓ Pocos ejemplos de prevención integral y sostenida a nivel nacional dirigida a la población adecuada con la intensidad adecuada
 - ✓ En la defensa a veces falta prevención; debe reforzarse la defensa del tratamiento y la prevención
- Debe haber difusión de la prevención
 - ✓ En los informes se incluyen recomendaciones a los gobiernos, los donantes, los organismos multilaterales, los proveedores, los investigadores y la sociedad civil

¿Qué quiere decir “Difusión de la prevención del VIH”?

- Una combinación de estrategias de prevención basadas en evidencias ofrecidas con suficiente cobertura, interés, intensidad y duración para lograr un impacto óptimo sobre la sanidad pública
- Basado en sólidas evidencias epidemiológicas y datos de evaluación y adaptado a la dinámica de una epidemia nacional
- Objetivos concretos para fomentar la responsabilidad
- Implicación de un amplio grupo de participantes en la planeación, incluyendo tanto a la sociedad civil como a los infectados por el VIH

Factores de tratamiento del problema que aumentan la vulnerabilidad

- El riesgo de infección es una interacción entre la conducta individual y el contexto social
- Se necesitan acciones para tratar los factores motores subyacentes de la epidemia, incluyendo:
 - ✓ Desigualdad de género
 - ✓ Discriminación institucionalizada frente a grupos vulnerables
 - ✓ Pobreza
 - ✓ Estigmatización del VIH
 - ✓ Conflictos y emergencias humanitarias

Acceso insuficiente a la prevención

- *Preservativos*
 - Utilizados sólo en el 9% de las prácticas sexuales de riesgo
 - Producción inferior a la necesaria
- *Pruebas*
 - Sólo el 12% de los hombres y el 10% de las mujeres de los países más afectados del África subsahariana conocen su estado
- *Prevención de la transmisión madre a hijo*
 - Sólo el 11% de las mujeres embarazadas infectadas por VIH en países con ingresos bajos o medios reciben profilaxis antirretroviral
- *Jeringuillas estériles*
 - Sólo el 3% de los consumidores de drogas inyectables tienen acceso a jeringuillas estériles
- *Acceso en grupos vulnerables*
 - 9% de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres; < del 20% trabajadores del sexo

FIGURA 3: Cobertura de servicios esenciales de prevención de VIH (2005)





FIGURA 10: Prevención de la transmisión de madre a hijo - Cobertura en países selectos (2005)



Fuente: UNICEF/WHO/UNAIDS, 2007

Nuevas previsiones sobre la incidencia del VIH

- *Tendencia actual...*
 - ✓ 60 millones de nuevas infecciones para 2015
 - ✓ Aumento del 20% en nuevas infecciones anuales para 2012
- *Con una amplia difusión de la prevención...*
 - ✓ Podrían evitarse la mitad de las infecciones previstas para 2015; podrían evitarse el 52% de las infecciones previstas para el África subsahariana
 - ✓ Incidencia anual de VIH en 2015 reducida en casi dos tercios
 - ✓ Incluir la circuncisión masculina como parte de un conjunto integral de programas


Obstáculos actuales en la difusión de la prevención

- Financiación insuficiente
- Grupos de mayor riesgo sin suficiente orientación
- Limitaciones de capacidad
- Fragmentación del servicio
- Estigmatización y discriminación

Elementos comunes de las iniciativas a nivel nacional con éxito

- Las campañas de prevención con éxito en Brasil, Senegal, Tailandia y Uganda compartían estos elementos comunes:
 - ✓ Financiación adecuada y sostenida
 - ✓ Apoyo político visible
 - ✓ Acción bien definida, informada y basada en datos
 - ✓ Uso de medios de comunicación de masas y otros canales para aumentar la concienciación sobre el VIH
 - ✓ Medidas contra la estigmatización
 - ✓ Involucración de las comunidades afectadas y distintos sectores

FIGURA 6: Número anual de nuevas infecciones de VIH en Tailandia, 1985-2003



Fuente: Ministerio tailandés de Salud Pública, 2004

¿Próximos éxitos en prevención?

- *Camboya*
 - Descenso de la prevalencia del VIH a la mitad en una década
- *Haití*
 - Descenso de casi la mitad de la prevalencia del VIH en mujeres embarazadas
- *Kenia*
 - Duplicación del uso de preservativos entre mujeres jóvenes; retraso del inicio de las relaciones sexuales
 - Descenso en la prevalencia del VIH
- *Zambia*
 - Aumento en las ventas de preservativos; retraso en el inicio de las relaciones sexuales
 - Descenso en la prevalencia de VIH en mujeres embarazadas
- *Zimbabue*
 - Aumento de seis veces en las pruebas de detección
 - Descenso en la prevalencia e incidencia de VIH

Recomendaciones

- Gobiernos nacionales
 - ✓ Desarrollo de procesos de planeación nacional integrales
 - ✓ Definición de objetivos de prevención
 - ✓ Mayor vigilancia
 - ✓ Tratamiento de la estigmatización y los factores de vulnerabilidad
 - ✓ Integración de prevención y tratamiento
 - ✓ Mejora de los controles y la evaluación
 - ✓ Valoración y mejora continua de las iniciativas
 - ✓ Fomento de la investigación de la prevención

Recomendaciones

- Donantes internacionales
 - ✓ Duplicar la ayuda para el VIH, incluyendo la prevención
 - ✓ Aunar esfuerzos con colaboradores
 - ✓ Crear capacidad de sociedad civil
 - ✓ Trabajar por un acceso universal
- Organismos multilaterales y técnicos
 - ✓ Coordinar el apoyo técnico para cumplir las necesidades de los países
 - ✓ Ofrecer valoraciones independientes de las estrategias nacionales
 - ✓ Ayudar a mejorar los sistemas nacionales de información sobre el VIH
 - ✓ Controlar los flujos de recursos

Recomendaciones

- Entornos sanitarios
 - ✓ Integrar la prevención del VIH en los sistemas sanitarios
 - ✓ Informar de forma regular sobre la utilización y el impacto
 - ✓ Adoptar prácticas de control de la infección
 - ✓ Proporcionar educación sobre salud sexual a los trabajadores
- Investigación
 - ✓ Mejora del conocimiento de los factores de vulnerabilidad
 - ✓ Aumento de la investigación en implementación y operaciones
 - ✓ Desarrollo de nuevas tecnologías y enfoques
- Sociedad civil
 - ✓ Apoyo de una respuesta integral
 - ✓ Control de las respuestas de prevención nacional
 - ✓ Participación en organismos de planeación nacional

Nuevo sitio Web de PWG

www.GlobalHIVPrevention.org

- Disponible en el sitio Web:
 - Hojas de datos e informes de PWG
 - Estadísticas clave
 - Información para responsables de políticas
 - Vínculos relacionados con la prevención
 - **Regístrese** para recibir actualizaciones en la lista de correo