

**Глобальная
профилактика
ВИЧ-инфекции**

**Global HIV Prevention
Working Group**

Июнь 2007 г.

Группа Global HIV Prevention Working Group

- Основана в 2002 году. Цель – предоставить информацию для разработки глобальной политики, планирования программ и принятия решений по финансированию.
- Создана Фондом супругов Гейтс при участии Семейного фонда Кайзера
- Это группа специалистов мирового уровня – эпидемиологов, ученых и юристов.
- Периодически издает доклады и информационные бюллетени по методикам и научному обоснованию профилактики ВИЧ-инфекции.
- Пропагандирует современные, научно обоснованные методы борьбы со СПИД/ВИЧ.

Предыдущие доклады группы PWG

- *Глобальная мобилизация для профилактики ВИЧ: План действий (A Blueprint for Action)* (июль 2002 г.).
- *Доступность профилактики ВИЧ: Заполнение пробелов (Closing the Gap)* (май 2003 г.).
- *Профилактика ВИЧ-инфекции в эпоху эффективного лечения (HIV Prevention in the Era of Expanded Treatment Access)* (июнь 2004 г.).
- *Новые методы профилактики ВИЧ-инфекции: Ускорение исследований и доступность в будущем* (август 2006 г.).

Новый доклад по глобальной профилактике

- Передачу ВИЧ любым способом можно предотвратить.
 - ✓ Доказана эффективность как самой профилактики, так и методик ее глобализации.
- Однако работа по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции ведется очень низкими темпами.
 - ✓ Ограниченная доступность профилактики заражения.
 - ✓ Несколько примеров продолжительных, комплексных мер профилактики, проводимых на национальном уровне с достаточной интенсивностью в группах риска.
 - ✓ Публичная пропаганда редко затрагивает вопросы профилактики, хотя именно профилактика должна быть ключевым моментом пропаганды.
- Профилактику необходимо вести на глобальном уровне
 - ✓ В докладе приведены рекомендации для правительства, финансирующих организаций, многопрофильных агентств, поставщиков услуг, исследователей и простых граждан.

Что подразумевается под «глобализацией» профилактики ВИЧ-инфекции?

- Набор научно обоснованных методик профилактики, имеющих достаточный охват, интенсивность и продолжительность, простых для понимания и оказывающих максимальный эффект на общественное здоровье.
- Обоснованность эпидемиологических фактов и оценочных данных, привязанных к динамике национальных эпидемий.
- Контрольные точки (или цели) стимуляции ведения учета
- Привлечение к планированию заинтересованных групп, включая гражданское общество и ВИЧ-инфицированных.

Воздействие на факторы, повышающие уязвимость

- Риск заражения зависит от индивидуального поведения и социальных факторов.
- Появляется необходимость борьбы с основными причинами эпидемий, а именно следующими:
 - ✓ Половое неравенство
 - ✓ Узаконенная дискриминация групп риска
 - ✓ Бедность
 - ✓ Предрассудки в отношении ВИЧ-инфекции
 - ✓ Локальные конфликты и социальные катастрофы

Недостаточная доступность профилактики

- *Презервативы*
 - Используются только в 9% половых актов, относящихся к группе риска.
 - Дефицит составляет миллионы единиц.
- *Проверка на ВИЧ-инфекцию*
 - Только 12% мужчин и 10% женщин в странах Тропической Африки, где ВИЧ-инфекция распространена больше всего, знают свой ВИЧ-статус.
- *Профилактика передачи заболевания от матери к ребенку*
 - Только 11% ВИЧ-инфицированных беременных женщин в странах с низким и средним уровнем дохода проходят антиретровирусную профилактику.
- *Стерильные шприцы*
 - Только 3% потребителей внутривенных наркотиков пользуются стерильными шприцами.
- *Доступность среди групп риска*
 - Только 9% гомосексуалистов и менее 20% работников секс-индустрии.

Рисунок 3. Распределение основных средств профилактики ВИЧ-инфекции (2005 год)





Рисунок 10. Распределение профилактики вертикального пути передачи ВИЧ (от матери к ребенку) в отдельных странах (2005 год)



Источник: ЮНИСЕФ/ВОЗ/ЮНЭЙДС, 2007 год

Новые прогнозы распространения ВИЧ- инфекции

- *Текущая тенденция...*
 - ✓ 60 миллионов новых случаев заражения к 2015 году
 - ✓ Ежегодное увеличение новых случаев заражения на 20% к 2012 году
- *При осуществлении комплексной профилактики...*
 - ✓ Предотвращение половины случаев заражения, ожидаемых к 2015 году; предотвращение 52% случаев заражения в странах Тропической Африки
 - ✓ Снижение ежегодного числа новых случаев заражения ВИЧ почти на две трети к 2015 году
 - ✓ Включение обрезания (циркумцизио) в комплекс мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией


Препятствия для глобализации профилактики

- Недостаточное финансирование
- Недостаточный эффект в группах высокого риска
- Ограничение возможностей
- Разрозненность в предоставлении услуг
- Предрассудки и дискриминация

Ключевые факторы успеха национальных программ

- Успешные кампании по профилактике в Бразилии, Сенегале, Таиланде и Уганде имели общие характерные черты:
 - ✓ Достаточное и постоянное финансирование
 - ✓ Ощутимая политическая поддержка
 - ✓ Четкая постановка целей и научная обоснованность
 - ✓ Использование СМИ и других методов повышения осведомленности населения о ВИЧ-инфекции
 - ✓ Борьба с предрассудками
 - ✓ Вовлечение как людей из групп риска, так и представителей других социальных слоев

Рисунок 6. Ежегодное число новых ВИЧ-инфицированных в Таиланде, 1985-2003 гг.



Источник: Министерство общественного здоровья Таиланда, 2004 год

Примеры успешной профилактики

- *Камбоджа*
 - Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снижена в два раза всего за десять лет.
- *Гаити*
 - Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди беременных женщин снижена почти в два раза.
- *Кения*
 - Молодые женщины используют презервативы в два раза чаще. Отмечается более позднее начало половой жизни.
 - Снижение распространенности ВИЧ-инфекции.
- *Замбия*
 - Рост продаж презервативов, более позднее начало половой жизни.
 - Снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди беременных женщин.
- *Зимбабве*
 - Шестикратное увеличение числа проходящих добровольное консультирование и тестирование.
 - Снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Рекомендации

- Национальные правительства
 - ✓ Разработать всестороннюю национальную программу планирования
 - ✓ Сформулировать цели профилактики
 - ✓ Усилить контроль за мерами профилактики
 - ✓ Воздействовать на уязвимые социальные группы и предрассудки
 - ✓ Объединить профилактику и лечение
 - ✓ Повысить эффективность мониторинга и оценки
 - ✓ Постоянно анализировать и дорабатывать меры профилактики
 - ✓ Спонсировать научные исследования

Рекомендации

- Международные финансирующие организации
 - ✓ Удвоить финансирование борьбы с ВИЧ-инфекцией, включая действия по профилактике
 - ✓ Согласовать действия с партнерами
 - ✓ Повышать готовность гражданского общества
 - ✓ Способствовать доступности профилактики
- Многопрофильные и технические агентства
 - ✓ Координировать техническую поддержку в соответствии с потребностями страны
 - ✓ Предоставить независимую оценку национальных стратегий
 - ✓ Содействовать улучшению национальных информационных систем о ВИЧ-инфекции
 - ✓ Контролировать потоки ресурсов

Рекомендации

- **Медицинские учреждения**
 - ✓ Внедрять профилактику ВИЧ-инфекции в систему здравоохранения
 - ✓ Регулярно предоставлять отчетность о результатах профилактики
 - ✓ Внедрять принципы инфекционного контроля
 - ✓ Повышать уровень информированности сотрудников в области сексуального здоровья
- **Исследовательские организации**
 - ✓ Уделять больше внимания факторам, повышающим заболеваемость
 - ✓ Расширять теоретические и практические исследования
 - ✓ Разрабатывать новые технологии и методики
- **Гражданское общество**
 - ✓ Поддерживать комплексное реагирование
 - ✓ Следить за национальными мерами реагирования в отношении профилактики
 - ✓ Принимать участие в работе национальных органов планирования

Новый веб-сайт группы PWG

www.GlobalHIVPrevention.org

- Материалы, доступные на сайте:
 - Доклады и информационные бюллетени группы PWG
 - Основная статистика
 - Информация для разработчиков методик
 - Ссылки на ресурсы, посвященные профилактике
 - **Подписка** – рассылка новых сведений